

هر قرص حاوی:
استامینوفن
۲۵۰ میلی گرم
آسپیرین
۲۵۰ میلی گرم
کافئین
۶۵ میلی گرم

أفین میگرن®

مناسب برای سردرد های میگرنی

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید. در صورتی که این دارو را بدون نسخه پزشک تهیه نموده اید، در خصوص نحوه و میزان مصرف دارو با داروساز مشورت نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:

• وجود هرگونه حساسیت

• استفاده از سایر داروها

• بارداری و شیردهی

• ابتلاء به بیماری های دیگر

موارد مصرف داروی أفین میگرن®:

این دارو به عنوان ضد تب، ضد التهاب و مسکن و برای درمان درد هایی نظیر سردرد، دندان درد، کمر درد، دردهای قاعدگی، درد های ناشی از سرماخوردگی و آنفلوآنزا و همچنین به عنوان تب بر استفاده می شود.

موارد منع مصرف أفین میگرن®:

• در بیماران با سابقه حساسیت به استامینوفن، آسپیرین و کافئین، منع مصرف دارد.

• مصرف این دارو در افراد با علایم آسم، آبریزش بینی و پولیپ بینی، توصیه نمی شود.

• مصرف این دارو در کودکان و نوجوانان با علایم عفونت های ویروسی، توصیه نمی شود.

• مصرف این دارو در افراد با سابقه حساسیت به داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

در صورتی که دارو را به صورت OTC و بدون تجویز پزشک مصرف می کنید باید به نکات زیر توجه نمایید:

• در صورت سابقه آسم، آرتروز، دیابت، نقرس، مشکلات قلبی، افزایش فشار خون، سابقه مشکلات کلیوی و کبدی شدید، خونریزی معده و سابقه معده درد و یا دریافت داروی دیورتیک به پزشک خود اطلاع دهید.

• در صورت عدم بهبود علایم درد پس از ۱۰ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید. در صورت عدم بهبود علایم تب پس از ۳ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

• در بیماران دچار کمبود G6PD یا فاویسم این دارو باید با احتیاط استفاده شود.

• در صورت نیاز به استفاده از این دارو، همراه با داروهای ضد لخته خون با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• در بیماران مبتلا به اضطراب این دارو باید با احتیاط استفاده شود.

• در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی این دارو با احتیاط استفاده شود. (در بیماران آریتمی استفاده نشود)

• با توجه به وجود آسپیرین در این ترکیب، دارو می تواند سبب زخم و خونریزی گوارشی شود. این ریسک در صورت وجود زخم معده، مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، مصرف همزمان الکل و یا استفاده طولانی مدت از دارو و همچنین در افراد بالای ۶۰ سال، افزایش می یابد.

• در صورتی که این دارو با سایر ترکیبات حاوی استامینوفن استفاده شود ریسک بروز عوارض کبدی افزایش می یابد. (حداکثر مقدار مجاز مصرف استامینوفن ۴ گرم در روز می باشد).

• این دارو در کودکان و نوجوانان مبتلا به عفونت های ویروسی از جمله آنفولانزا نباید استفاده شود. (تغییرات رفتاری به همراه تهوع و استفراغ از جمله علائم اولیه سندرم Reye می باشد که در صورت وقوع، باید مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید).

• مصرف این دارو بیش از ۱۰ روز در ماه توصیه نمی شود.

تداخلات دارویی:

آفین میگرن® نباید همزمان با داروهای زیر مصرف گردد:

باربیتورات ها، هیدانتوئین ها و کاربامازپین، سایر داروهای آنتی هیستامین و داروهای اعصاب (ضدافسردگی، آرام بخش و ...)، نزال فعال شده، سایمتیدین، داروهای ضد بارداری خوراکی، مگنزیلین، ایزونیاژید، لاموتریجین، فلوروکینولون ها، داروهای مهارکننده ی مونو آمین اکسیداز مانند سلزیلین، هیالورونیداز، واکسن ویروس آنفلوانزا (زنده / ضعیف شده)، کتورولاک (نازال)، سیستمیک، ماسیمولین، اوماستاکسین، سولفین پیرازون، اوروکیناز واکسنهای حاوی ویروس آبله مرغان، مهارکننده های آنزیم تبدیل کننده آنتیوتانسین، اسپیرولولاکتون، سولفین پیرازون، تیکاگلور

راهنمای مقدار و نحوه ی صحیح مصرف آفین میگرن®:

• پیش از مصرف این دارو، استفاده از هرگونه داروی دیگر یا فرآورده های گیاهی، سنتی و مکمل را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

• مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

در بزرگسالان و افراد بالای ۱۶ سال ۲ قرص هر ۸-۶ ساعت بعد از غذا و همراه با یک لیوان کامل آب.

• در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و از دوبرابر کردن دوز دارو خودداری کنید.

بارداری و شیردهی:

• مصرف این دارو در دوران بارداری، به خصوص سه ماه آخر بارداری توصیه نمی شود، مگر در شرایط خاص و به تشخیص پزشک متخصص.

• مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود. در صورت ضرورت مصرف دارو طبق تجویز پزشک متخصص، از شیر دادن به کودک در طول دوره درمان خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موارات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه کلیه ی این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود. در صورت بروز هر یک از این عوارض، پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار دهید: معده درد، زخم های گوارشی، سوء هاضمه، تهوع و استفراغ، خونریزی، وزوز گوش راش و کهیر پوستی، کبودی یا خونریزی به دلیل غیر قابل توضیح، آسم و تنگی نفس، برونکواسپاسم، آنمی، کاهش فشار خون، تاکی کاردی، افزایش سطح آنزیم های کبدی، مشکلات کلیوی، مشکلات کبدی، کاهش شنوایی، سندرم REYE، آنژیوادم و واکنش های آنافیلاکتیک، سرگیجه شدید یا غش کردن.

شرایط نگهداری:

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

• دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

• از نگهداری و مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه شامل یک قوطی محتوی ۱۴ یا ۲۰ عدد قرص آفین میگرن® می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت:

داروسازی افق دارو

ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghpharma.com