

هر کپسول حاوی:	
استامینوفن	۲۰۰ میلی گرم
کافئین	۲۵ میلی گرم
کلفنیرامین	۲/۵ میلی گرم
ویتامین ث	۱۵۰ میلی گرم

اُفین کامپلکس®

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید. در صورتی که این دارو را بدون نسخه پزشک تهیه نموده اید، در خصوص نحوه و میزان مصرف دارو با داروساز مشورت نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:

- وجود هرگونه حساسیت
- استفاده از سایر داروها
- بارداری و شیردهی
- ابتلاء به بیماری های دیگر

موارد مصرف اُفین کامپلکس®:

این دارو به دلیل وجود استامینوفن متعلق به دسته دارویی مسکن و ضد درد ها میباشد و در تب و درد های ناشی از سرماخوردگی و آنفلوآنزا استفاده می شود و همچنین به دلیل وجود کلرفنیرامین در بهبود علائم حساسیت و آبریزش بینی استفاده میشود و وجود ویتامین ث و کافئین باعث بهبود سریع سرماخوردگی و همچنین کاهش اثرات خواب آوری کلرفنیرامین میشود.

موارد منع مصرف اُفین کامپلکس®:

- اگر سابقه حساسیت به ماده موثر یا مواد جانبی دیگری که در داخل داروی شماست.
- نشانه هایی از واکنش های آلرژیک شامل راش پوستی و مشکلات تنفسی. و همچنین نشانه هایی مانند از تورم در پاها، دست ها، صورت، گلو یا زبان
- در بیماران با سابقه گلوکوم، گرفتگی دهانه مئانه، حین حملات حاد آسم

هشدارها و موارد احتیاط:

- اگر که سابقه مشکلات کبدی یا کلیوی حاد دارید.
- اگر که سابقه مشکلات کبدی به دلیل مصرف الکل دارید.
- مصرف همزمان این دارو با سایر داروهای حاوی استامینوفن (نیاز به مشورت با پزشک یا داروساز دارد)
- در صورت عدم بهبود علائم درد پس از ۱۰ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.
- در صورت عدم بهبود علائم تب پس از ۳ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.
- مصرف همزمان این دارو با بعضی از دارو ممکن است باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته شود که بهتر است با پزشک و یا داروساز مشورت کنید.
- به دلیل احتمال اثر بر روی سیستم اعصاب مرکزی در حین فعالیت هایی که نیاز به هوش و حواس دارند با آگاهی استفاده شود.
- در بیماران قلبی، افراد با سابقه فشار چشم، افراد با سابقه بیماری تنفسی و بیماران تیرویدی با احتیاط مصرف شود.
- در بیماران چار کمبود G6PD یا فایوایسم این دارو باید با احتیاط استفاده شود.

تداخلات دارویی:

- اُفین کامپلکس® نباید همزمان با داروهای زیر مصرف گردد:
- استفاده از الکل به همراه این دارو امکان افزایش ابتلا به سمیت کبدی را افزایش می دهد.
- استفاده همراه با باربیتورات ها و کاربامازپین امکان کاهش اثر داروی استامینوفن و همینطور احتمال آسیب کبدی را افزایش می دهد.
- به دلیل اثر روی سیستم اعصاب مرکزی با سایر داروهای آنتی هیستامین، داروهای اعصاب (ضد افسردگی، آرام بخش و ...) استفاده نشود.

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف آفین کامپلکس®:

پیش از مصرف این دارو، استفاده همزمان از هرگونه داروی دیگر یا فرآورده های گیاهی، سنتی و مکمل را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

• در بزرگسالان و افراد بالای ۱۲ سال هر ۸ ساعت ۲ قرص

• در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
• از دوبرابر کردن دوز دارو خودداری کنید.

بارداری و شیردهی:

برای مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب خود ممکن است موجب بروز اثرات ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود. در صورت بروز هر یک از این عوارض پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار دهید:

• در صورت بروز هرگونه راش پوستی مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه نمایید.

• استفاده این دارو ممکن است باعث گیجی، غلیظ شدن ترشحات برونش شود.

• به دلیل وجود کافیین ممکن است در بیماران دارای سابقه باعث تاکی کاردی، تپش قلب و راش پوستی شود.

• از دیگر عوارض میتوان به بی حالی، سردرد، افزایش وزن، درد شکمی، اسهال، افزایش اشتها، حالت تهوع، احساس خشکی در دهان، عدم تخلیه کامل ادرار و ضعف نام برد.

شرایط نگهداری:

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید.

• دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه شامل یک قوطی محتوی ۱۴ یا ۲۰ عدد قرص آفین کامپلکس® می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت:

داروسازی افق دارو

ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghpharma.com