

هر قرص حاوی:

ایبوپروفن ۲۰۰ میلی گرم
متوکاربامول ۵۰۰ میلی گرم

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- وجود هرگونه حساسیت
- استفاده از سایر داروها
- بارداری و شیردهی
- ابتلاء به بیماری های دیگر

داروی ادیو پرایم® برای چه بیماری تجویز می گردد؟

این دارو از ترکیب دو ماده موثره ایبوپروفن و متوکاربامول تشکیل شده است که ایبوپروفن متعلق به دسته دارویی مسکن و داروی ضد التهاب غیر استروئیدی و متوکاربامول متعلق به دسته دارویی شل کننده عضلات است و در دردهای عضلانی و گرفتگی ماهیچه استفاده می شود.

موارد منع مصرف ادیو پرایم® کدام است؟

- در صورت استفاده از دارو های دیگر شامل متوکاربامول و ایبوپروفن و یا اگر سابقه حساسیت به متوکاربامول و ایبوپروفن و یا هر ماده جانبی، از استفاده این محصول خودداری کنید.
- در صورت سابقه حساسیت به ایبوپروفن(نظیر واکنش های آنافیلاکتیک، واکنش های پوستی) یا سابقه بیماری آسم، رینیت آلرژیک، التهاب صورت، زبان، لب ها، گلو
- در صورت استفاده از داروهای دیگر ضد التهاب های غیر استروئیدی دیگر از مصرف این دارو خودداری کنید.
- در صورت سابقه زخم معده، یا خونریزی معده از استفاده این دارو خودداری کنید.
- در صورت سابقه بیماری کلیوی، کبدی، قلبی از استفاده این دارو خودداری کنید.

هشدارها و موارد احتیاط:

- از مصرف همزمان این دارو با سایر فرآورده های حاوی ایبوپروفن خودداری نمایید.
- دارو را همراه یا بلافاصله بعد از غذا با یک لیوان آب مصرف نمایید.
- در طول درمان با این دارو، از مصرف فرآورده های الکل خودداری نمایید.
- مصرف این دارو ممکن است سبب خواب آلودگی شود، لذا درصورت رانندگی یا کار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری کامل دارند، خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

نباید همزمان با داروهای زیر مصرف گردد:

- استفاده همراه با داروهای ضدلخته، داروهای فشارخون توصیه نمیشود و بهتر است با پزشک یا داروساز خود قبل از استفاده مشورت کنید.
- استفاده همراه این دارو با داروهای اعصاب(داروهای خواب آور،مهار کننده های سیستم عصبی و ...)به دلیل وجود متوکاربامول بهتر است استفاده نشود.

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف ادیو پرایم® :

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

- در بزرگسالان ۳-۲ قرص روزی ۲-۱ بار در روز توصیه میشود.
- در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و از دوبرابر کردن دوز دارو خودداری کنید. از قطع مصرف ادیو پرایم® بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.

بارداری و شیردهی:

برای مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب خود ممکن است موجب بروز اثرات ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود. در صورت بروز هر یک از این عوارض پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار دهید:
- در صورت بروز علائم گوارشی نظیر درد، خونریزی مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک مراجعه کنید.

شرایط نگهداری:

- دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دارو دور از دید و دسترس کودکان نگهداری گردد.
- بعد از هر بار مصرف درپوش ظرف را محکم ببندید.

بسته بندی:

هر جعبه شامل یک قوطی محتوی ۱۴ یا ۲۰ عدد قرص ادیو پرایم® می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت:

داروسازی افق دارو

ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghdarou.com

	Artwork Name: Leaflet of Adeeve Prime®	
	Doc. No.: AW-991010022-LFT-0137	Version No.: 1
Type: Leaflet	Pantone: N/A	Size: A5
Effective date:		Page 2 of 2

Revision History:

Version No.	Brief Description of Revision	Reason for Revision/ change
01	N/A	Execution of new artwork for new product