

سوسپانسیون خوراکی دومپریون®

۱ میلی گرم در ۱ میلی لیتر

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

-وجود هرگونه حساسیت

-استفاده از سایر داروها

-بارداری و شیردهی

-ابتلا به بیماری های دیگر

داروی دومپریون® برای چه بیماری تجویز می گردد؟

این دارو برای درمان تهوع و استفراغ در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال (با وزن بیشتر از ۳۵ کیلوگرم) تجویز می گردد.

موارد منع مصرف دومپریون® کدام است؟

-حساسیت به دومپریدون و یا هر یک از اجزاء تشکیل دهنده دارو

-کودکان زیر ۱۲ سال یا با وزن کمتر از ۳۵ کیلوگرم

-در صورت داشتن مشکلات شدید کبدی

-افراد با سابقه نارسای قلبی و آریتمی

-تومور غده هیپوفیز

-انسداد یا پارگی روده

هشدارها و موارد احتیاط:

قبل از مصرف این دارو، در موارد ذکر شده در ادامه به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید:

-مشکلات کبدی و اختلال یا نارسای عملکرد کبد

-مشکلات کلیوی و اختلال یا نارسای عملکرد کلیه

-مصرف داروی لوودوپا

-در صورت مشاهده مدفوع سیاه یا قیری رنگ (خون در مدفوع) بلافاصله دارو را قطع کرده و به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

-در صورت مشاهده اختلالات ریتم قلب مانند تپش قلب و تنگی نفس به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید:

داروهای ضد قارچ به ویژه کتوکنازول خوراکی، فلوکنازول یا وریکونازول

برخی از آنتی بیوتیک ها مانند اریترومایسین، کلاریترومایسین، تلیترومایسین، موکسی فلوکسازین و پنتامیدین

داروهای قلبی یا تنظیم فشار خون مانند آمیودارون، دروندرون، کینیدین، دیسوپیرامید، دوفتیلید، سوتالول، دیلتیازم، وراپامیل

داروهای سایکوز یا روان پریشی مانند هالوپریدول، پیموزاید، سرتیندول

داروهای ضد افسردگی مانند سیتالوپرام، اس سیتالوپرام

داروهای درمان اختلالات گوارشی مانند سیزاپراید، دولاسترون، پروکالوپراید

داروی ایدز یا اچ آی وی (مهارکننده های پروتئاز)

داروهای ضد سرطان به عنوان مثال تورمیفن، واندتانیب، وینکامین

داروهای ضد اسید معده

داروی آپومورفین

داروهای دیگر شامل داروهای بدون نسخه و داروهای گیاهی

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف دومپریون® :

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

برای بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال با وزن بیشتر از ۳۵ کیلوگرم، دوز توصیه شده یک پیمانه، حداکثر سه بار در روز معادل ۳۰ میلی لیتر می باشد.

- دارو حداقل ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از غذا مصرف گردد.

- در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز، مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و از دوبرابر کردن دوز دارو خودداری کنید.

- از قطع مصرف داروی دومپریون® بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.

- قبل و بعد از هر بار مصرف، پیمانه را بشویید و درپوش بطری را محکم ببندید.

- فقط از پیمانه داخل جعبه برای اندازه گیری مقدار دارو، استفاده نمایید.

بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری یا شیردهی، قبل از مصرف این دارو، با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض جانبی:

- هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگر چه کلیه ی این عوارض در یک فرد دیده نمی شود.

عوارض جانبی رایج در زمان مصرف دومپریون® شامل موارد زیر می باشد:

- خشکی دهان

- سردرد

- خواب آلودگی

- حساسیت

شرایط نگهداری:

دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت و داخل بسته بندی اصلی نگهداری نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

از نگهداری و مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

یک ماه پس از باز شدن درب بطری، باقیمانده ی دارو دور ریخته شود.

بسته بندی:

بطری شیشه ای ۱۲۰ میلی لیتری (حاوی یک میلی گرم ماده موثره دومپریدون در هر یک میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی)

هر جعبه حاوی بطری شیشه ای ۱۲۰ میلی لیتری به همراه پیمانه مدرج ۱۰ میلی لیتری و برگه ی راهنما می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت : داروسازی افق دارو

شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو - ایران

پاسخگویی و مشاوره علمی : ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghdarou.com