

سوسپانسیون خوراکی جوی فست*

۳۰ میلی گرم در ۵ میلی لیتر

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.
قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز برسانید:

- وجود هرگونه حساسیت

- استفاده از سایر داروها

- بارداری و شیردهی

- ابتلا به بیماری های دیگر

داروی جوی فست* برای چه بیماری تجویز می گردد؟

- رینیت آلرژیک فصلی در کودکان ۲ تا ۱۱ سال

- کهیر مزمن ایدیوپاتیک در کودکان ۶ ماه تا ۱۱ سال

موارد منع مصرف جوی فست* کدام است؟

- سابقه حساسیت به فکسوفنادین و یا هر یک از اجزای سازنده دارو

هشدارها و موارد احتیاط:

- قبل از مصرف این دارو، در صورت مصرف هر گونه داروی نسخه ای، بدون نسخه، محصولات طبیعی و ویتامین ها، پزشک خود را مطلع سازید.

- این دارو ممکن است بر روی برخی از نتایج آزمایشگاهی تأثیر بگذارد، لذا در مورد مصرف این دارو به کارکنان آزمایشگاه اطلاع دهید.

- مصرف فکسوفنادین در افراد بالای ۶۵ سال، احتمال بروز عوارض جانبی را بیشتر می کند.

- از مصرف همزمان میوه و یا آب میوه ی گریپ فروت با فکسوفنادین خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

- تجویز فکسوفنادین با کتوکونازول یا اریترومیسین منجر به افزایش غلظت پلاسمایی فکسوفنادین می شود.

- فکسوفنادین نباید همزمان با آنتی اسیدهای حاوی آلومینیوم و منیزیم مصرف شود.

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف جوی فست*:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

رینیت آلرژیک فصلی در کودکان ۲ تا ۱۱ سال: دوز مصرفی ۳۰ میلی گرم دو بار در روز است. در کودکان با نارسائی یا کم کاری کلیه، دوز ۳۰ میلی گرم (۵ میلی لیتر) یک بار

در روز به عنوان دوز شروع توصیه می شود.

کهیر مزمن ایدیوپاتیک در کودکان ۶ ماه تا ۱۱ سال: دوز مصرفی برای بیماران ۶ ماهه تا کمتر از ۲ سال، ۲/۵ میلی لیتر (معادل یک چهارم پیمانه) دو بار در روز و برای بیماران

۲ تا ۱۱ سال، ۵ میلی لیتر (نصف پیمانه) دو بار در روز می باشد. دوز اولیه توصیه شده برای کودکان ۶ ماهه تا کمتر از ۲ سال با عارضه نارسائی یا کم کاری کلیه، ۲/۵ میلی لیتر

(معادل یک چهارم پیمانه) یک بار در روز و برای کودکان ۲ تا ۱۱ سال، ۵ میلی لیتر (نصف پیمانه) یک بار در روز است.

- در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و از دوبرابر کردن دوز

دارو خودداری کنید.

- قبل از هر بار استفاده، بطری را به خوبی تکان دهید.

- از قطع مصرف داروی جوی فست* بدون مشورت با پزشک خودداری نمایید.

- قبل و بعد از هر بار مصرف، پیمانه را بشویید و دربوش بطری را محکم ببندید.

- فقط از پیمانه داخل جعبه برای اندازه گیری مقدار دارو، استفاده نمایید.

بارداری و شیردهی:

در صورت بارداری یا شیردهی، قبل از مصرف این دارو، با پزشک خود مشورت کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه کلیه ی این عوارض در یک فرد دیده نمی شود. در صورت مشاهده ی

هر یک از این عوارض با پزشک خود مشورت نمایید:

عوارض جانبی شایع: سردرد، سرگیجه، استفراغ

عوارض جانبی غیر شایع: خستگی، اختلالات خواب، استرس و اضطراب

شرایط نگهداری:

دارو را دور از نور و رطوبت و در دمای کمتر از

۳۰ درجه سانتی گراد داخل بسته بندی اصلی

نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

دارو را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

بطری شیشه ای ۱۲۰ میلی لیتری (حاوی ۳۰ میلی گرم ماده موثره فکسوفنادین در ۵ میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی)

هر جعبه حاوی بطری شیشه ای ۱۲۰ میلی لیتری به همراه پیمانه مدرج ۱۰ میلی لیتری و برگه ی راهنما می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت: داروسازی افق دارو

شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو - ایران

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghdarou.com