

تلوسین[®] ۰/۴ پیوسته رهش

تامسولوسین هیدروکلراید

۳۰ کپسول پیوسته رهش

راهنمایی های عمومی

این دارو برای درمان بیماری شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه ی آن به دیگران خودداری نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:

• وجود هر گونه حساسیت

• استفاده از سایر داروها

• ابتلا به بیماری های دیگر

کپسول پیوسته رهش تلوسین[®] برای چه بیماری تجویز می گردد؟

این دارو حاوی ماده موثره تامسولوسین هیدروکلراید می باشد که برای درمان علائم و نشانه های هایپرپلازی خوش خیم پروستات توصیه می شود، عضلات صاف در پروستات را شل کرده و باعث بهبود جریان ادرار می شود.

موارد منع مصرف کپسول تلوسین[®] کدام است ؟

در صورت حساسیت به تامسولوسین هیدروکلراید و یا هر یک از اجزا فرمولاسیون، از مصرف این محصول خودداری نمایید.

هشدارها و موارد احتیاط :

• در صورت مصرف طولانی مدت این دارو، انجام معاینات پزشکی دوره ای الزامی می باشد.

• مصرف این دارو در بیماران با سابقه و ابتلا به اختلال عملکرد کلیه ها با مشورت پزشک یا داروساز صورت گیرد.

• برای کاهش احتمال سرگیجه یا بیهوش شدن، اگر دراز کشیده اید یا نشسته اید به آرامی بلند شوید، برای بالا یا پایین رفتن از پله ها احتیاط نمایید.

• در صورت بروز واکنش های آلرژیک ، مصرف این دارو را بلافاصله قطع نمایید و پزشک و یا داروساز خود را مطلع نمایید.

• اگر در آینده قصد جراحی آب مروارید یا سایر جراحی های چشم را خواهید داشت، پزشک خود را مطلع نمایید.

• این دارو ممکن است موجب بروز سرگیجه گردد، لذا از انجام فعالیت هایی که نیازمند هوشیاری کامل می باشد با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

• دارو را به طور کامل بلعیده و از جویدن یا خرد کردن آن خودداری نمایید.

تداخلات دارویی :

• از مصرف همزمان این دارو با سایر فرآورده های دارویی مانند: اریترومیسین، کتوکنازول و دیکلوفناک خودداری نمایید.

مقدار و نحوه ی صحیح مصرف :

• در بزرگسالان ۱ عدد کپسول در روز توصیه می شود.

• در بیماران که علائم مانند غش یا سرگیجه بعد از ۲ هفته با دو میلی گرم نداشته باشند دوز دارو را می توانند تا ۸ میلی گرم در روز افزایش یابد.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب خود ممکن است موجب بروز اثرات ناخواسته نیز شود ، اگر چه همه عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود ، در صورت بروز هر یک از این عوارض پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار دهید:

عوارض جانبی متداول :

سرگیجه، مشکل در انزال

عوارض جانبی غیر متداول :

سردرد، تپش قلب، تورم التهاب داخل بینی ،بیوست، اسهال، تهوع، خارش، کهیر پوستی، احساس ضعف بیحالی.

عوارض جانبی نادر:

غش کردن، آتزیو ادم.

شرایط نگهداری :

• دارو را در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

• دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی :

هر جعبه شامل ۳ بلیستر ۱۰ عددی از کپسول پیوسته رهش تلوسین[®] می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت :

داروسازی افق دارو

ایران -شهر صنعتی کاوه ،بلوار افق دارو

www.ofoghdaru.com

پاسخگویی و مشاوره علمی : ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰