

پیشگیری از عود زخم اثنی عشر- برای جلوگیری از ظهور مجدد زخم اثنی عشر دوز توصیه شده مصرف ۲۰ میلی گرم فاموتیدین در شب می باشد. زخم معده خوش خیم- دوز توصیه شده مصرف ۴۰ میلی گرم فاموتیدین در شب است، که دوره درمان باید بین ۴ تا ۸ هفته ادامه یابد مگر اینکه بهبودی سریع تر یا آندوسکوپی مشخص شود. سندرم زولینگر-الیسون- در این بیماران درمان باید با دوز ۲۰ میلی گرم فاموتیدین هر ۶ ساعت شروع شود، سپس با توجه به پاسخ فرد تنظیم شود. دوزهای تا ۸۰ میلی گرم در روز تا یک سال بدون ایجاد عوارض جانبی قابل توجه یا تاکیفیلاکسی استفاده شده است. درمان ازوفازیت خفیف تا متوسط- دوز توصیه شده در مورد ازوفازیت خفیف ۲۰ میلی گرم فاموتیدین دو بار در روز است. در مورد ازوفازیت خفیف تا متوسط، دوز توصیه شده ۴۰ میلی گرم دو بار در روز است. به طور کلی طول دوره درمان ۶ هفته است ولی اگر وضعیت بهبود نیافته باشد، درمان باید برای ۶ هفته دیگر ادامه یابد.

اختلال کلیوی- در بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه که پاکسازی کراتینین در آنها کمتر از ۳۰ میلی لیتر در دقیقه است و همچنین بیماران دیالیزی دوز روزانه فاموتیدین باید به ۵۰ درصد کاهش یابد. قرص فاموتیدین ۲۰ میلی گرم باید در پایان دیالیز یا پس از آن تجویز شود زیرا مقداری از ماده موثره با دیالیز حذف می شود.

افراد مسن: دوزهای توصیه شده برای بیماران مسن مانند بزرگسالان است. **فراموشی دوز:** اگر یک نوبت دوز مصرف دارو را فراموش کردید به محض یادآوری آنرا مصرف کنید. اما اگر نزدیک به دوز بعد بود، نوبت فراموش شده را نادیده بگیرید و دیگر مصرف نکنید. هر گونه دوز یا مقدار نوبت بعدی را در صورت فراموشی دو برابر نکنید.

مصرف فاموکسیم® در دوران بارداری و شیردهی: مصرف این دارو در دوران بارداری توصیه نمی شود و فقط در صورت نیاز باید تجویز شود. از آنجایی که فاموتیدین در شیر مادر ترشح می شود، بنابراین مادران شیرده باید مصرف فاموتیدین و یا شیردهی را قطع کنند.

عوارض جانبی: هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب خود ممکن است موجب بروز اثرات ناخواسته نیز شود، اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود. از جمله عوارض جانبی شایع این دارو می توان به سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال اشاره کرد. در صورت بروز هر یک از عوارض ذکر شده، فوراً به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
- دارو را دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف نمایید.
- دوره درمان خود را کامل کنید.
- فروش بدون نسخه پزشک ممنوع می باشد.

بسته بندی: هر جعبه حاوی ۳ بلیستر ۱۰ عددی قرص روکشدار فاموکسیم® می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت: داروسازی افق دارو ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰۰ www.ofoghdarou.com

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید. قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:

- وجود هر گونه حساسیت
- استفاده از سایر داروها
- بارداری و شیردهی
- ابتلا به بیماری های دیگر

موارد مصرف فاموکسیم®:

داروی فاموکسیم (فاموتیدین) در درمان زخم اثنی عشر و پیشگیری از عود زخم اثنی عشر، زخم معده خوش خیم، سندرم زولینگر-الیسون و ازوفازیت (التهاب مری) خفیف تا متوسط کاربرد دارد. فاموتیدین با مسدود کردن گیرنده های هیستامین H2، سبب مهار ترشح اسید معده می شود.

موارد منع مصرف فاموکسیم®:

- بیماران با سابقه حساسیت به فاموتیدین یا هر یک از اجزای تشکیل دهنده این دارو
- مصرف این دارو در افراد با سابقه حساسیت به سایر آنتاگونیست های گیرنده H2 مانند رانیتیدین و سایمتیدین توصیه نمی شود.

هشدارها و موارد احتیاط:

- در بیماران دچار تومور بدخیم معده، باید قبل از استفاده از فاموتیدین برای درمان زخم معده دوره درمان جهت حذف تومور کامل گردد.
- از آنجایی که فاموتیدین عمدتاً از طریق کلیه ها دفع می شود، این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی باید با احتیاط مصرف گردد.
- در بیماران مسن باید با احتیاط استفاده شود.

- در صورت درمان طولانی مدت با دوز بالا، نظارت بر شمارش سلول های خونی و عملکرد کبد توصیه می شود.

- در بیماران مبتلا به بیماری زخم معده مزمن، از قطع ناگهانی دارو پس از رفع علائم باید اجتناب گردد.

فاموکسیم® نباید همزمان با داروهای زیر مصرف گردد:

- جذب داروهای آتازاناویر، کتوکونازول و ایتراکونازول در مصرف همزمان با فاموتیدین کاهش می یابد. لذا این داروها باید دو ساعت قبل از مصرف فاموتیدین تجویز شوند.
- پروبنیسید با مهار ترشح فاموتیدین باعث افزایش ۵۰ درصدی غلظت فاموتیدین در پلاسما می شود. بنابراین از مصرف همزمان پروبنیسید و فاموتیدین باید خودداری شود.

- مصرف همزمان فاموتیدین و آنتی اسیدها می تواند جذب فاموتیدین را کاهش داده و منجر به کاهش سطوح پلاسمایی فاموتیدین شود. بنابراین، فاموتیدین باید ۱ تا ۲ ساعت قبل از مصرف آنتی اسید مصرف شود.

- مصرف همزمان سوکرافیت باعث مهار جذب فاموتیدین می شود، بنابراین نباید در مدت ۲ ساعت پس از مصرف فاموتیدین تجویز شود.

در بیماران همودیالیزی در صورت مصرف همزمان با فاموتیدین خطر کاهش اثر کلسیم کربنات وجود دارد.

راهنمای مقدار و نحوه صحیح مصرف فاموکسیم®:

پیش از شروع مصرف این دارو، استفاده از هر نوع دارو یا فرآورده های گیاهی، سنتی و مکمل را به پزشک یا داروساز خود اطلاع دهید. این دارو به صورت خوراکی بوده و میتوانید همراه با غذا یا بدون غذا مصرف کنید.

میزان مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، اما مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به شرح ذیل می باشد:

بزرگسالان:

زخم اثنی عشر- دوز اولیه توصیه شده ۴۰ میلی گرم فاموتیدین است که باید در شب مصرف شود. در حالت کلی بهبودی در اکثر بیماران در عرض ۴ هفته رخ می دهد. اما اگر معاینه آندوسکوپی نشان دهد که زخم بهبود یافته است، ممکن است این دوره کوتاه تر شود. با این حال، در آن دسته از بیمارانی که زخم آنها در این دوره ۴ هفته ای بهبود نیافته است، درمان باید برای ۴ هفته دیگر ادامه یابد.

	Artwork Name: Leaflet of famoxim®	
	Doc. No.: AW-991010046-LFT-0068	Version No.: 1
Type: Leaflet	Pantone: N/A	Size: A5
Effective date:		Page 2 of 2

Revision History:

Version No.	Brief Description of Revision	Reason for Revision/ change
01	N/A	Execution of new artwork for new product