



راهنمای مقدار و نحوه ی صحیح مصرف اُفین®:

پیش از مصرف این دارو، استفاده از هرگونه داروی دیگر یا فرآورده های گیاهی، سنتی و مکمل را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

- در بزرگسالان ۱-۲ قرص هر ۴ تا ۶ ساعت در صورت لزوم – هرگز بیش از ۲ قرص همزمان و ۸ قرص در ۲۴ ساعت مصرف نشود.
- در کودکان بالای ۱۲ سال ۱ قرص هر ۶ ساعت – مصرف بیش از ۵ قرص در ۲۴ ساعت توصیه نمی شود مگر با تجویز پزشک.

بارداری و شیردهی:

برای مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی، با پزشک یا داروساز خود مشورت نمایید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات درمانی مطلوب خود ممکن است موجب بروز اثرات ناخواسته نیز شود. اگرچه همه این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود.

در صورت بروز هر یک از این عوارض پزشک یا داروساز خود را مطلع نمایید:

مدفوع خونی، سیاه یا قیری رنگ، ادرار کدر یا مشاهده خون در ادرار، زردی پوست و سفیدی چشم ها، راش پوستی، درد ناحیه کمر، خارش، ظاهر شدن لکه های سفید یا زخم بر روی لب و دهان، گلودرد، خستگی مفرط، سرگیجه، تهوع، استفراغ، گیجی، افت فشارخون، آریتمی قلبی، عوارض خونی. مصرف دوزهای درمانی بالاتر از حد معمول در طولانی مدت می تواند ایجاد مسمومیت نماید. علائم مسمومیت تهوع و استفراغ است که معمولا در ۲۴ ساعت اول بروز می کند و پس از این زمان همراه با احساس درد و حساس شدن در ناحیه شکم می باشد. در صورت بروز علائم فوق و یا مصرف اتفاقی بیش از مقدار توصیه شده سریعاً به پزشک مراجعه نمایید.

شرایط نگهداری:

- در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
- دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه شامل یک قوطی محتوی ۱۴ یا ۲۰ عدد قرص اُفین® ۵۰۰ می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت:

داروسازی افق دارو

ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghdarou.com



اُفین® ۵۰۰

استامینوفن ۵۰۰ میلی گرم

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است.

قبل از مصرف موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:

- وجود هرگونه حساسیت
- استفاده از سایر داروها
- بارداری و شیردهی
- ابتلاء به بیماری های دیگر

موارد مصرف داروی اُفین®:

درمان درد هایی نظیر سردرد، دندان درد، کمر درد، دردهای قاعدگی، درد های ناشی از سرماخوردگی و آنفلوانزا و همچنین به عنوان تب بر استفاده می شود.

موارد منع مصرف اُفین®:

- در کودکان زیر ۱۲ سال
- مصرف همزمان با سایر فرآورده های حاوی استامینوفن

هشدارها و موارد احتیاط:

- در صورت مشاهده نشانه هایی از واکنش های آلرژیک مانند راش پوستی، مشکلات تنفسی و همچنین نشانه هایی از تورم در قسمت هایی از بدن مانند: پا، دست، صورت، گلو یا زبان، مصرف دارو قطع گردد.
- در صورت عدم بهبود علائم درد پس از ۱۰ روز بهتر است با پزشک مشورت شود.
- در صورت عدم بهبود علائم تب پس از ۳ روز بهتر است با پزشک مشورت شود.
- مصرف همزمان این دارو با بعضی داروها ممکن است باعث بروز عوارض جانبی ناخواسته شود که بهتر است با پزشک و یا داروساز مشورت شود.
- در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده، بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه نمایید .
- از مصرف همزمان این دارو با سایر ترکیبات حاوی استامینوفن خودداری نمایید.
- از مصرف همزمان این دارو با فرآورده های حاوی الکل خودداری نمایید.
- این دارو ممکن است در نتایج برخی آزمایش های پزشکی تأثیر بگذارد. لذا در صورت مصرف آن طی ۳ الی ۴ روز قبل از انجام آزمایش ، پزشک را از مصرف این دارو مطلع نمایید.
- در هر وعده بیش از ۲ قرص و در ۲۴ ساعت بیش از ۸ قرص مصرف ننمایید.

تداخلات دارویی:

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می نمایید، پزشک خود را مطلع سازید، اُفین® نباید همزمان با داروهای زیر مصرف گردد:

باربیتورات ها و کاربامازپین، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، آسپیرین و سایر سالیسیلاتها، داروهای ضد انعقاد خون

	Artwork Name: Leaflet of Opheen®	
	Doc. No.: AW-991010021-LFT-0049	Version No.: 1
Type: Leaflet	Pantone: N/A	Size: A5
Effective date:		Page 2 of 2

Revision History:

Version No.	Brief Description of Revision	Reason for Revision/ change
01	N/A	Execution of new artwork for new product