

تداخلات دارویی:

اُفین میگرن® نباید همزمان با داروهای زیر مصرف گردد:

باربیتورات ها، هیدانتوئین ها و کاربامازپین، سایر داروهای آنتی هیستامین و داروهای اعصاب (ضدافسردگی، آرام بخش و ...)، زغال فعال شده، سایمتیدین، داروهای ضد بارداری خوراکی، مگزیتین، ایزونیاژید، لاموتریجین، فلوروکینولون ها، داروهای مهارکننده ی مونو آمین اکسیداز مانند سالتیلین، هیالورونیداز، واکسن ویروس آنفلوانزا (زنده / ضعیف شده)، کتورولاک (نازال، سیستمیک)، ماسیمورلین، اوماستاکسین، سولفین پیرازون، اوروکیناز، واکسنهای حاوی ویروس آبله مرغان، مهارکنندههای آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین، اسپرونولاکتون، سولفین پیرازون، تیکاگrolر

راهنمای مقدار و نحوه ی صحیح مصرف اُفین میگرن®:

• پیش از مصرف این دارو، استفاده از هرگونه داروی دیگر یا فرآورده های گیاهی، سنتی و مکمل را به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.

• مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می کند، ولی مقدار مصرف این دارو به طور عمومی به قرار زیر است:

در بزرگسالان و افراد بالای ۱۶ سال ۲ قرص هر ۸-۶ ساعت بعد از غذا و همراه با یک لیوان کامل آب.

• در صورت فراموشی مصرف دارو، دوز فراموش شده در اسرع وقت، در همان روز مصرف و دوزهای آتی مطابق روال گذشته مورد استفاده قرار گیرد و از دوبرابر کردن دوز دارو خودداری کنید.

بارداری و شیردهی:

• مصرف این دارو در دوران بارداری، به خصوص سه ماه آخر بارداری توصیه نمی شود، مگر در شرایط خاص و به تشخیص پزشک متخصص.

• مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود. در صورت ضرورت مصرف دارو طبق تجویز پزشک متخصص، از شیر دادن به کودک در طول دوره درمان خودداری کنید.

عوارض جانبی:

هر دارو به موازات اثرات مطلوب درمانی ممکن است باعث بروز برخی عوارض ناخواسته نیز شود، اگرچه کلیه ی این عوارض در یک فرد مشاهده نمی شود. در صورت بروز هر یک از این عوارض، پزشک یا داروساز خود را در جریان قرار دهید: معده درد، زخم های گوارشی، سوء هاضمه، تهوع و استفراغ، خونریزی، وزوز گوش راش و کهیر پوستی، کبودی یا خونریزی به دلیلی غیر قابل توضیح، آسم و تنگی نفس، برونکواسپاسم، آنمی، کاهش فشار خون، تاکی کاردی، افزایش سطح آنزیم های کبدی، مشکلات کلیوی، مشکلات کبدی، کاهش شنوایی، سندرم REYE، آنژیوادم و واکنش های آنافیلاکتیک، سرگیجه شدید یا غش کردن.

شرایط نگهداری:

• در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.

• دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.

• از نگهداری و مصرف داروی تاریخ گذشته خودداری کنید.

بسته بندی:

هر جعبه شامل یک قوطی محتوی ۱۴ یا ۲۰ عدد قرص اُفین میگرن® می باشد.

دارنده پروانه و محل ساخت:

داروسازی افق دارو

ایران، شهر صنعتی کاوه، بلوار افق دارو

پاسخگویی و مشاوره علمی: ۰۲۱-۸۹۳۳۲۰۰۰

www.ofoghdarou.com

اُفین میگرن®

استامینوفن ۲۵۰ میلی گرم / آسپیرین ۲۵۰ میلی گرم / کافئین ۶۵ میلی گرم

راهنمایی های عمومی:

این دارو برای درمان بیماری فعلی شما تجویز شده است. لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه به دیگران خودداری نمایید.

در صورتی که این دارو را بدون نسخه پزشک تهیه نموده اید، در خصوص نحوه و میزان مصرف دارو با داروساز مشورت نمایید.

قبل از مصرف این دارو موارد زیر را به اطلاع پزشک یا داروساز خود برسانید:

• وجود هرگونه حساسیت

• استفاده از سایر داروها

• بارداری و شیردهی

• ابتلاء به بیماری های دیگر

موارد مصرف داروی اُفین میگرن®:

این دارو به عنوان ضد تب، ضد التهاب و مسکن و برای درمان دردهایی نظیر سردرد، دندان درد، کمر درد، دردهای قاعدگی، درد های ناشی از سرماخوردگی و آنفلوانزا و همچنین به عنوان تب بر استفاده می شود.

موارد منع مصرف اُفین میگرن®:

• در کودکان زیر ۱۲ سال مصرف نگردد.

• مصرف همزمان این دارو با سایر ترکیبات حاوی استامینوفن و آسپیرین خودداری نمایید.

هشدارها و موارد احتیاط:

در صورتی که دارو را به صورت OTC و بدون تجویز پزشک مصرف می کنید باید به نکات زیر توجه نمایید:

• در صورت مصرف اتفاقی بیش از مقدار تعیین شده، بلافاصله به پزشک یا بیمارستان مسمومین مراجعه نمایید.

• در صورت عدم بهبود علائم درد پس از ۱۰ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید. در صورت عدم بهبود علائم تب پس از ۳ روز بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.

• از مصرف این دارو در ساعات نزدیک به زمان خواب خودداری نمایید.

• در صورت نیاز به استفاده از این دارو، همراه با داروهای ضد لخته خون با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.

• در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی این دارو با احتیاط استفاده شود. (در بیماران آریتمی استفاده نشود)

• با توجه به وجود آسپیرین در این ترکیب، دارو می تواند سبب زخم و خونریزی گوارشی شود. این ریسک در صورت وجود زخم معده، مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، مصرف همزمان الکل و یا استفاده طولانی مدت از دارو و همچنین در افراد بالای ۶۰ سال، افزایش می یابد.

• در صورتی که این دارو با سایر ترکیبات حاوی استامینوفن استفاده شود ریسک بروز عوارض کبدی افزایش می یابد. (حداکثر مقدار مجاز مصرف استامینوفن ۴ گرم در روز می باشد).

• این دارو در کودکان و نوجوانان مبتلا به عفونت های ویروسی از جمله آبله مرغان یا آنفلوانزا نباید استفاده شود. (تغییرات رفتاری به همراه تهوع و استفراغ از جمله علائم اولیه سندرم Reye می باشد که در صورت وقوع، باید مصرف دارو را قطع کرده و به پزشک خود اطلاع دهید.

• مصرف این دارو بیش از ۱۰ روز در ماه توصیه نمی شود.

	Artwork Name: Leaflet of Opheen Migraine®	
	Doc. No.: AW-991010031-LFT-0054	Version No.: 1
Type: Leaflet	Pantone: N/A	Size: A5
Effective date:		Page 2 of 2

Revision History:

Version No.	Brief Description of Revision	Reason for Revision/ change
01	N/A	Execution of new artwork for new product